Обзорная статья

УДК 616.727.8-002-77-089.843

<https://doi.org/10.18019/1028-4427-2024-30-2-309-319>

Эволюция эндопротезирования первого плюснефалангового сустава

Г.П. Котельников, А.Н. Николаенко, И.О. Гранкин, В.В. Иванов, П.Ю. Исайкин✉,
С.О. Дороганов, Д.О. Згирский

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Российская Федерация

Автор, ответственный за переписку: Павел Юрьевич Исайкин, pavelisaykin@mail.ru

Аннотация

Введение. Среди заболеваний первого плюснефалангового сустава (1 ПФС), требующих оперативного лечения, выделяют остеоартроз (до 69 %), ревматоидный артрит (до 26 %), а также опухоли, опухолеподобные заболевания и гнойные артриты (до 5 %). Актуальность лечения артроза 1 ПФС определяется высокой заболеваемостью и функциональной значимостью этой анатомической структуры. Хирургия суставов на сегодняшний день сосредоточена на восстановительном эндопротезировании, при котором используют импланты, выдерживающие вес тела человека, восстанавливающие движения в суставе, поддерживающие функцию плюсне-сесамовидных суставов, а также сохраняющие длину плюсневой кости.

Цель работы — проанализировать данные зарубежной и отечественной литературы, посвященной эндопротезированию 1 ПФС, и кратко представить аналитические данные по результатам использования различных имплантов.

Материалы и методы. В данной статье представлены обобщенные сведения отечественных и зарубежных публикаций на тему эндопротезирования 1 ПФС. В информационных системах PubMed, eLIBRARY, MedLine, Scopus проводился анализ литературы с использованием следующей терминологии: «эндопротезирование первого плюснефалангового сустава», «оперативное лечение hallux rigidus», «остеоартроз первого плюснефалангового сустава», «results of endoprosthesis of the 1st metatarsophalangeal joint», «modernization of implants of the 1st metatarsophalangeal joint». Проанализированы материалы с 1968 по 2022 год включительно.

Результаты и обсуждение. Идеальный имплант должен восстанавливать движения, улучшать функцию, поддерживать суставную стабильность, распределять нагрузку на суставные поверхности и быть износостойким. На протяжении многих лет использовались различные материалы для достижения простоты и надежности конструкций. Эндопротезы совершенствовались и изменялись. Их стали подразделять на группы по материалу и конструкции, а также по признакам ограничения степеней свободы, состава трибологической пары, количества замещения суставных поверхностей.

Заключение. Импланты нового поколения имеют более прочную конструкцию, анатомичную форму и улучшенную остеоинтеграцию. Эти достижения обусловили повышение удовлетворенности пациентов и увеличение срока службы эндопротезов. Тем не менее, остается высокий процент осложнений после эндопротезирования 1 ПФС. Это свидетельствует о необходимости продолжения исследований и дальнейшей работы по усовершенствованию имплантов, чтобы сделать их более эффективными и удобными в использовании.

Ключевые слова: эндопротезирование первого плюснефалангового сустава, остеоартроз первого плюснефалангового сустава, эволюция эндопротезирования суставов стопы

Для цитирования: Котельников Г.П., Николаенко А.Н., Гранкин И.О., Иванов В.В., Исайкин П.Ю., Дороганов С.О., Згирский Д.О. Эволюция эндопротезирования первого плюснефалангового сустава. *Гений ортопедии*. 2024;30(2):309-319. doi: 10.18019/1028-4427-2024-30-2-309-319. EDN: XAPJHT.

Evolution of the first metatarsophalangeal joint replacement

G.P. Kotelnikov, A.N. Nikolaenko, I.O. Grankin, V.V. Ivanov, P.Yu. Isaykin✉,
S.O. Doroganov, D.O. Zgirsky

Samara State Medical University, Samara, Russian Federation

Corresponding author: Pavel Yu. Isaykin, pavelisaykin@mail.ru

Abstract

Introduction The diseases of the first metatarsophalangeal (1 MTP) joint that require surgical treatment include osteoarthritis (69 %), rheumatoid arthritis (26 %), tumors, tumor-like diseases and purulent arthritis (5 %). The treatment of arthritic 1 MTP is aimed at reducing pain and improving function. Joint replacement implants are meant to support body weight, maintain the length of the first metatarsal, provide metatarsal-sesamoid joint functioning and restore joint motion.

The purpose of the work was to analyze data from foreign and domestic literature on endoprosthetics of the 1 MTP, and briefly present analytical data on the results of using various implants.

Material and methods The article presents the summary of the Russian and foreign publications on 1 MTP joint replacement. The original literature search was conducted on key resources including PubMed, eLIBRARY, MedLine, Scopus. The search strategy was comprised of keywords: “replacement of the first metatarsophalangeal joint”, “surgical treatment of hallux rigidus”, “osteoarthrosis of the first metatarsophalangeal joint”, “results of endoprosthetics of the 1st metatarsophalangeal joint”, “modernization of implants of the 1st metatarsophalangeal joint”. Publications brought out between 1968 and 2022 inclusive were analyzed.

Results and discussion The ideal implant should restore functional range of motion, improve function, maintain joint stability, distribute the stress across joint surfaces being wear-resistant. Over the years, various materials have been used to provide simple and reliable designs. Implants have been improved and divided into groups based on material and design, limited degrees of freedom, tribological pair composition, and the amount of articular surface replacement.

Conclusion New generation implants have a more durable design, anatomical shape and improved osseointegration. The advances in joint replacement have resulted in greater patient satisfaction and increased service life. The complication rate for replacement of the 1 MTP joint remains high. This indicates the need for continued research and further work to improve implants to make them more effective and easier to use.

Keywords: endoprosthesis replacement of the first metatarsophalangeal joint, osteoarthritis of the first metatarsophalangeal joint, evolution of endoprosthesis replacement of the foot joints

For citation: Kotelnikov GP, Nikolaenko AN, Grankin IO, Ivanov VV, Isaykin PYu, Doroganov SO, Zgirsky DO. Evolution of the first metatarsophalangeal joint replacement. *Genij Ortopedii*. 2024;30(2):309-319. doi: 10.18019/1028-4427-2024-30-2-309-319

ВВЕДЕНИЕ

Одной из главных особенностей строения стопы является наличие продольного и поперечного сводов, которые обеспечивают равномерное распределение нагрузки между пяточным бугром и 5 плюсневыми костями, а также выполняют амортизирующую функцию во время ходьбы и бега. В среднем 50 % опорной нагрузки приходится на головку первой плюсневой кости, входящей в состав первого плюснефалангового сустава (1 ПФС). Также 1 ПФС имеет большое значение в биомеханике ходьбы человека, обеспечивая телу ускорение по горизонтали в фазе толчка [1, 2]. Даже незначительное повреждение данного сустава приводит к нарушению нормального функционирования стопы, ограничивая трудовую и бытовую деятельность человека.

Среди заболеваний 1 ПФС, требующих оперативного лечения, выделяют остеоартроз (до 69 %), ревматоидный артрит (до 26 %), а также опухоли, опухолеподобные заболевания и гнойные артриты (до 5 %). Актуальность лечения артроза 1 ПФС определяется высокой заболеваемостью населения болезнями этой анатомической структуры. Остеоартроз 1 ПФС (*hallux rigidus*) — это дегенеративно-дистрофическое заболевание, связанное с повреждением суставного хряща. Этиология данной патологии многогранна и связана с нарушениями сустава различными факторами: травматическими, биомеханическими, метаболическими, нервно-мышечными, послеоперационными и другими [3, 4]. Перед врачом стоит непростая задача выбора способа лечения в зависимости от степени артроза, возраста пациента, его ожиданий и уровня активности. Консервативное лечение может обеспечить удовлетворительные показатели у отдельных пациентов с 0-й и 1-й степенью артроза первого плюснефалангового сустава с низкими функциональными запросами. На средних стадиях артроза выполняются органосохраняющие операции, такие как изолированная хейлэктомия или остеотомии проксимальной фаланги и плюсневой кости. Для лечения тяжелых артрозов 3-й степени, при которых суставные поверхности полностью разрушены, применяют артродезирование, эндопротезирование и артропластику по Келлеру [5].

Несмотря на то, что артродез первого плюснефалангового сустава остается «золотым стандартом» лечения *hallux rigidus*, данный способ лечения не приводит к значительному улучшению функциональных результатов. В то же время, артродезирование не обходится без осложнений, таких как несращение, искривление оси первого луча и разрушение металлофиксаторов [6, 7]. В хирургии суставов на сегодняшний день преобладает восстановительное эндопротезирование, при котором используют импланты, выдерживающие вес тела человека. Также современные эндопротезы обеспечивают восстановление движений в 1 ПФС и поддерживают функцию плюсне-сесамовидных суставов [8]. Показаниями для применения эндопротезирования 1 ПФС являются артрозы (идиопатический, посттравматический и дегенеративный), проведение ревизионных операций (по методам Brandes – Keller и Morbus Köhler), а также ревматоидный артрит.

В настоящий момент существует множество видов эндопротезов 1 ПФС, отличающихся по строению, материалам, трибологической паре трения. Несмотря на то, что каждый вид импланта прошел длительный путь эволюции в несколько десятков лет, эндопротезирование 1 ПФС приводит к противоречивым результатам и большому числу послеоперационных осложнений [9].

Цель работы — проанализировать зарубежные и отечественные научные публикации, посвященные эндопротезированию 1 ПФС, и кратко представить аналитические данные по результатам использования различных имплантов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В данной статье представлены обобщенные сведения отечественных и зарубежных публикаций на тему эндопротезирования 1 ПФС, описана эволюция развития и проектирования эндопротезов 1 ПФС, представлена классификация наиболее распространенных имплантов 1 ПФС. Отбор научных источников проведен в информационных системах PubMed, eLIBRARY, MedLine, Scopus с использованием следующих поисковых слов и словосочетаний: эндопротезирование первого плюснефалангового сустава, оперативное лечение *hallux rigidus*, остеоартроз первого плюснефалангового сустава, results of endoprosthetics of the 1st metatarsophalangeal joint, modernization of implants of the 1st metatarsophalangeal joint. В анализ включены материалы, опубликованные с 1968 по 2022 г. Кроме того, в данный обзор вошли сведения статей, посвященных функциональной анатомии и биомеханике 1 ПФС.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Важную роль для успешного проведения эндопротезирования 1 ПФС и исключения интра- и послеоперационных осложнений играет знание анатомии и биомеханики этой структуры.

1 ПФС состоит из 4 костей и включает в себя головку первой плюсневой кости, основание проксимальной фаланги первого пальца, а также две эллипсоидные сесамовидные кости. По форме этот сустав относят к шаровидным. Он имеет 3 степени свободы: сгибание/разгибание, отведение/приведение, наружная/внутренняя ротация. На подошвенной поверхности головки первой плюсневой кости имеются две борозды, разделенные гребнем, образующие суставные фасетки для сесамовидных костей, включенные в толщу капсулы сустава, которая представляет собой площадку и образует сесамовидный гамак [10].

Капсула 1 ПФС проксимально крепится к нижней части головки первой плюсневой кости, а дистально — к основанию проксимальной фаланги первого пальца. По бокам капсула укреплена коллатеральными связками, которые придают суставу дополнительную стабильность. С медиальной стороны к связке сесамовидного гамака фиксируется сухожилие мышцы, приводящей большой палец стопы, и медиальная головка сухожилия короткого сгибателя первого пальца. К латеральной части капсулы прикрепляется сухожилие мышцы, отводящей первый палец, и латеральная головка сухожилия короткого сгибателя первого пальца. Сесамовидные кости участвуют в равномерном распределении нагрузки, защите плюсневой и фаланговой суставных поверхностей и служат опорой в фазе толчка. Также сесамовидный гамак входит в состав фиброзно-хрящевой подошвенной пластины и создает прочную связь между звеньями сустава. С тыльной стороны 1 ПФС укреплен сухожилием мышцы короткого разгибателя первого пальца, который прикрепляется к верхней части основной фаланги, и сухожилием длинного разгибателя первого пальца, фиксирующегося к дистальной фаланге. Оба сухожилия закреплены фиброзным капюшоном, который вплетается в капсулу и дополнительно укрепляет сустав [11, 12].

Около 40 % цикла шага нагрузка приходится на передний отдел стопы. При этом она постепенно перераспределяется с латерального отдела на медиальный, из чего можно сделать вывод, что 1 ПФС имеет важную функцию в биомеханике ходьбы. Амплитуда движений в 1 ПФС в норме достигает 45° подошвенного сгибания и 90° тыльного сгибания при пассивных движениях, а под нагрузкой — 44°. В результате оценки нагрузки, действующей на 1 ПФС во время ходьбы, измеренной во время конечной фазы опоры стопы, предложено среднее значение силы, действующей на сустав, равное 0,86 × масса тела. Для 70-килограммового человека это значение равняется 61 Н [13, 14].

Исследования последних лет доказали, что звенья анатомических структур в виде связок, мышц, костей и капсулы 1 ПФС являются единым целым, в котором патология любой составляющей приводит к каскаду биомеханических нарушений и необратимым последствиям [15].

Исторически первоначальной целью создания эндопротеза 1 ПФС была разработка конструкции такой же простой и надежной, как современные импланты коленного или тазобедренного суставов. Однако при проектировании возникали трудности со структурными и функциональными особенностями 1 ПФС. Основная классификация наиболее распространенных эндопротезов 1 ПФС представлена в таблице 1.

Таблица 1

Классификация наиболее распространенных эндопротезов 1 ПФС [18, 19]

I. Гемизендопротезы	
	Силиконовые эндопротезы Swanson, 1968 г.; эндопротезы дизайна Swanson с модификацией по Weil, 1977 г.
	Металлические эндопротезы Swanson, 1986 г.; Townley, 1986 г.; HemiCap первого поколения, производство ArthroSurface, 1998 г.; HemiCap второго поколения, производство ArthroSurface, 2012 г.
II. Тотальные эндопротезы	
Связанные	Двустольный шарнирный силиконовый эндопротез 1 ПФС, дизайн Swanson, 1974 г.
	Двустольный шарнирный силиконовый эндопротез 1 ПФС с полиэстерными рукавами и дополнительным шовным материалом дизайна Kampner, производства Sutter Biomedical, 1971 г.
	Двустольный шарнирный силиконовый эндопротез 1 ПФС, дизайн Лоуренс и дизайн LaPorta, производства Sutter Biomedical, 1982 г.
	Двустольный силиконовый эндопротез 1 ПФС с дакроновым покрытием дизайна Helal, 1977 г. Двустольный шарнирный силиконовый эндопротез 1 ПФС, дизайн Swanson с титановыми втулками, производство Wright Medical, 1985г.
Несвязанные с парой трения металл-полимер	Тотальный эндопротез производства Richards Manufacturing с фаланговым компонентом из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы и плюсневый компонентом из нержавеющей стали, 1975 г.
	Тотальный эндопротез системы Total Toe System производства Biomet с плюсневый компонентом, изготовленным из титана, и фаланговым — из полиэтилена (Варшава, США), 1989 г.
	Тотальный эндопротез Bio action great toe implant производства Osteomed с плюсневый компонентом, изготовленным из кобальт-хрома, и фаланговым — из полипропилена (Техас, США), 1991 г.
Несвязанные с парой трения керамика-керамика	Эндопротез производства Moje Ceramic (Германия), 2004 г.
Несвязанные с парой трения металл-металл	Тотальный эндопротез системы Movement Great Toe System производства Integra (Нью-Джерси, США), 2019 г.
III. Интерпозиционные эндопротезы	
	Эндопротез дизайна Regno из нержавеющей стали, 1975 г.
	Эндрпротез дизайна Barouk из нержавеющей стали, 1987 г.
	Гидрогелевый эндопротез из поливинилового спирта производства CARTIVA (Джорджия, США), 2016 г.

На сегодняшний день эндопротезы 1 ПФС делятся на следующие категории:

- 1) по ограничению степеней свободы: связанные или несвязанные;
- 2) по трибологической паре: металл-металл, металл-полиэтилен, керамика-керамика, пирокарбон, силикон;
- 3) по количеству замещения суставных поверхностей: униполярные или биполярные [16].

Для выбора имплантата важно оценить степень разрушения суставных поверхностей головки плюсневой кости и основания проксимальной фаланги. В литературе нет точных рекомендаций для выбора того или иного имплантата, в большинстве случаев тактику определяет именно хирург, основываясь на собственном опыте, знакомстве с эндопротезом и оборудованием, используемым для операции [17].

Силиконовые эндопротезы

А.В. Swanson в 1968 г. впервые разработал два типа силиконовых полуинтерпозиционных имплантатов. Первым использовали эндопротез головки плюсневой кости, который впоследствии был заменен имплантом для основания проксимальной фаланги первого пальца стопы. Он представлял собой одноствольную конструкцию с силиконовой головкой и ножкой, предназначенной для замены суставной поверхности основания проксимальной фаланги (рис. 1, а). А.В. Swanson полагал, что имплант, размещенный именно на этой стороне сустава, станет наиболее стабильным, поскольку он не будет подвергаться чрезмерной нагрузке. Эндопротез использовался по принципу артропластики Келлера и действовал как распорка в межсуставной щели; объем движений при этом увеличился незначительно [20, 21]. Н.В. Ris et al. в своих исследованиях сообщили о состоянии 53 пациентов через 48 месяцев после операции, у которых были установлены 68 силиконовых гемиимплантатов конструкции Swanson. Физикальное обследование пациентов выявило уменьшение объема движений в 1 ПФС по сравнению с первоначальными показателями, зафиксированными у 62 % пациентов. Разрушение имплантата отмечено в 57 % случаев при рентгенологическом исследовании [22].

В 1971 г. S.L. Kampner разработал первый двуствольный силиконовый имплант, который изготавливался из силикона и полиэфирного материала. Первая конструкция содержала рукава из полиэстера, прикрепленные к ножкам, а также шовный материал для фиксации к надкостнице и улучшения стабильности эндопротеза. Дизайн с полиэфирными рукавами был позже снят с производства в связи с развитием тугоподвижности сустава и повышением нагрузки на шарнирную часть [23, 24].

В 1974 г. А.В. Swanson представил двуствольную конструкцию с двумя конусными ножками и гибким u-образным шарниром, который обеспечивал тыльное сгибание (рис. 1, б). Шарнир этого эндопротеза подвергался критике за то, что он не достигает физиологического объема движений. Изгиб ножек во фронтальной и боковой плоскостях отсутствовал. При установке оригинальной конструкции хирургу часто приходилось укорачивать ножку фалангового имплантата. Спустя год А.В. Swanson et al. представили силиконовый имплант с укороченными ножками [25].

В 1985 г. компания Wright Medical изготовила двуствольный эндопротез дизайна Swanson с титановыми втулками. Эти втулки разработаны для защиты ножек эндопротеза в наиболее уязвимом месте между краем резецированной кости и шарниром имплантата. Втулки запрессовывались в костномозговые каналы перед установкой имплантата [26]. В 1991 г. J. Gerbert провел ретроспективный анализ результатов эндопротезирования пациентов имплантатами Swanson с титановыми втулками. Были исследованы 22 пациента за период 33 месяца, средний возраст составил 61 год. Анкетирование проводили по шкале PASCOM (Podiatric Audit in Surgery and Clinical Outcome Measure), в 72 % случаев получены удовлетворительные результаты. Угол тыльного сгибания 1 пальца составил в среднем 21° [27, 28].

В 1982 г. компания Sutter Biomedical представила несколько конструкций силиконовых шарнирных имплантатов 1 ПФС стопы дизайна LaPorta и дизайна Lawrence (рис. 1, в, г). Эти эндопротезы в настоящее время производит компания Futura Biomedical. Обе конструкции включают в себя прямоугольно-конические ножки. Проксимальная ножка немного крупнее и длиннее дистальной, наклонена на 15° в тыльную сторону. Эта особенность включена в конструкцию, чтобы обеспечить физиологическое наклонение первой плюсневой кости без дополнительного напряжения шарнирной части. Имплант LaPorta подразделяется на правые, левые и нейтральные варианты компонентов, которые отличаются друг от друга углом наклона ножек в горизонтальной плоскости. У нейтрального дизайна угол наклона ножек в горизонтальной плоскости равен 0°, у правого и левого варианта угол наклона равен 10°. Имплантат Lawrence имеет нейтральную форму. Шарнир обоих имплантатов имеет форму песочных часов, при этом сгибание происходит в центральной части соединения. Конструкция LaPorta симметрична от тыльной до подошвенной части и рассчитана на 60° тыльного сгибания. Обе стороны головок имеют плоскую поверхность для того, чтобы обеспечить полное прилегание к костным краям. Дизайн Lawrence отличается тем, что шарнирная часть основной фаланги удлинена тыльно и наклонена вниз. Его основным преимуществом является обеспечение 85° тыльного сгибания. Подошвенный угол

на фаланговой стороне шарнира позволяет уменьшить объем резекции основной фаланги и, таким образом, увеличивает стабильность сустава за счет сохранения места прикрепления ножек сухожилия сгибателя [29, 30, 31].

Рис. 1. Внешний вид силиконовых эндопротезов 1 ПФС: а — одноствольный эндопротез 1 ПФС, дизайн Swanson, 1965 г.; б — двуствольный шарнирный эндопротез 1 ПФС, дизайн Swanson, 1974 г.; в — двуствольный шарнирный эндопротез 1 ПФС дизайн LaPorta, производство Sutter Biomedical, 1982 г.; г — двуствольный шарнирный эндопротез 1 ПФС, дизайн Lawrence, производство Sutter Biomedical, 1982 г. [26]

Проведено несколько исследований для оценки эффективности гибких шарнирных имплантатов. В 1989 г. W. Granberry et al. провели ретроспективное исследование 90 пациентов после эндопротезирования силиконовыми гибкими шарнирными эндопротезами в течение трех лет. Большинство пациентов указало на удовлетворительные результаты в отношении интенсивности боли. W. Granberry обнаружил три основных недостатка в использовании гибких шарнирных имплантатов. При осмотре у 30 % пациентов тыльное сгибание в 1 ПФС достигало менее 15° (тыльное сгибание первого пальца стопы является ключевым компонентом биомеханики ходьбы человека). Вторым осложнением являлось появление поражений кожи. У 69 % пациентов отмечались болезненные кератозы по подошвенной поверхности стопы в проекции головки первой плюсневой кости в результате укорочения первого луча. Третьим осложнением, отмеченным W. Granberry et al., было образование остеофитов в области 1 ПФС или вокруг него. Рентгенологическое исследование выявило образование остеофитов вокруг имплантата у 53 % пациентов [32].

Металлические эндопротезы

Металлические гемиэндопротезы разработаны, в основном, с целью устранения избыточной резекции суставной поверхности и укорочения первого луча при установке силиконовых имплантов [33]. В 1986 г. A.B. Swanson разработал гемиимплант из титана, который применялся для замены суставной поверхности основной фаланги (рис. 2, а). В 1987 г. С.О. Townley модифицировал эндопротез и начал его производить из сплава кобальта и хрома (рис. 2, б). Он отличался тонким мечевидным стержнем, при установке которого не требовалось дополнительной обработки костномозгового канала. В том числе, этот имплант включал в себя тонкую головку, что позволяло ограничить резекцию проксимальной фаланги и сохранить прикрепленные мягкие ткани. Эндопротезы производит компания Wright Medical в пяти размерах (от 0 до 4). Фаланговые полуимпланты не в полной мере уменьшали болевой синдром и улучшали подвижность сустава, так как первоначально не выполняли обработку дегенеративно измененной головки первой плюсневой кости. Впоследствии процедура шлифовки головки первой плюсневой кости стала обязательной при имплантации эндопротезов данной модели [34].

Рис. 2. Внешний вид металлических гемиэндопротезов 1 ПФС: а — гемиэндопротез 1 ПФС, дизайн Swanson, производство Wright Medical, Теннеси, США, 1986 г.; б — гемиэндопротез 1 ПФС, дизайн Townley, производство Wright Medical, Теннеси, США, 1986 г.; в — гемиэндопротез головки первой плюсневой кости HemiCap первого поколения, компания ArthroSurface, Массачусетс, США, 1998 г.; г — гемиэндопротез головки первой плюсневой кости HemiCap второго поколения, компания ArthroSurface, Массачусетс, США, 2012 г. [37]

K.F. Konkel et al. в 2009 г. провели ретроспективный анализ результатов лечения 33 пациентов с артрозом 1 ПФС, которым были установлены гемиэндопротезы. Средний период наблюдения составил 6 лет. У пациентов с ранними признаками артроза третьей степени был выявлен рецидив роста тыльного остеофита. По принятой в США шкале AOFAS (Шкала клинической оценки заболеваний стопы и голеностопного сустава Американской Ассоциации Ортопедов Стопы и Голеностопного Сустава) результаты лечения составили 67 баллов [18].

В 1998 г. также была разработана конструкция первого поколения для эндопротезирования головки плюсневой кости компанией Arthrosurface (Массачусетс, США) и названа HemiCap (рис. 2, в). Это двухкомпонентный имплант, суставная часть которого имела форму головки с кобальт-хромовой суставной поверхностью, а фиксирующий компонент представлял собой конический титановый винт для фиксации в плюсневой кости [35].

В 2012 г. компания Arthrosurface разработала имплантат второго поколения для головки первой плюсневой кости. Предыдущий имплантат HemiCap, используемый для гемиаартропластики, был модернизирован и получил название HemiCap DF (Dorsal Flange) (рис. 2, г). В новой конструкции HemiCap DF используется тыльный козырек, предназначенный для улучшения тыльного сгибания первого пальца во время ходьбы. Тыльный козырек, который изгибается на поверхности головки первой плюсневой кости, также предотвращает частое послеоперационное осложнение — повторный рост остеофитов [36].

В 2021 г. P.H. Jørsboe et al. провели анализ 116 пациентов, которым ранее был установлен эндопротез HemiCap первого и второго поколения. Через 2 года, 4 года и 6 лет после операции приживаемость протеза составила 87 %, 83 % и 74 % соответственно. При среднем пятилетнем наблюдении у 47 пациентов тыльное сгибание — 45°. Функциональные результаты, оцененные по шкале AOFAS, были $77,2 \pm 2,8$ балла и по Визуальной Аналоговой Шкале (ВАШ) — $2,0 \pm 1,6$ балла [38].

Во времена роста популярности двухстержневых силиконовых имплантов также свершилась «революция» в создании двухкомпонентных несвязанных эндопротезов. Силиконовые эндопротезы выходили из строя, главным образом, вследствие чрезмерного износа и стесненной конструкции. С более глубоким пониманием биомеханических характеристик 1 ПФС возникла потребность в конструкции, которая учитывала бы весовые нагрузки, скольжение и разнонаправленную подвижность сустава. Поскольку 1 ПФС является шарнирным суставом, при сгибании проксимальной фаланги под углом более 30° его ось в горизонтальной плоскости смещается в тыльную сторону. Поскольку силиконовые имплантаты с двумя ножками не были адаптированы к нормальному физиологическому объему движений, аномальные нагрузки, приложенные к имплантату, в конечном итоге приводили к его разрушению [39]. В 1985 г. A.M. Zeichner попытался сконструировать шаровидный эндопротез из существующих в то время материалов, чтобы избежать эффекта поршневой кинематики, характерного для шарнирных имплантатов, и создать протез с переменной осью [40]. P.F. Merkle и T.P. Sculco в 1989 г. разработали имплант из титанового сплава и полиэтилена высокой плотности и использовали полиметилметакрилатный костный цемент для его фиксации. Их конструкция не включала интрамедуллярную ножку на плюсневом компоненте. Из-за высокой частоты расшатывания (54,5 %) два имплантата были удалены. Авторы пришли к выводу, что эндопротезирование 1 ПФС с цементной фиксацией не дало удовлетворительных результатов, и рекомендовали дальнейшие исследования для улучшения методов фиксации [41].

Лишь в 1989 г. R.D. Koenig разработал двухкомпонентную систему для замены 1 ПФС, аналогичную той, которая используется для замены коленного сустава. Компонент головки плюсневой кости имел интрамедуллярный стержень и был изготовлен из титанового сплава. Для сочленения с сесамовидными костями, несущими нагрузку, в его состав входила подошвенная поверхность, воспроизводящая мышелки головки плюсневой кости. Фаланговый компонент изготовлен из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы с интрамедуллярным стержнем, и оба компонента устанавливали методом press-fit [42]. В настоящее время аналогичную систему Total Toe System выпускает компания Biomet (США, г. Варшава). Для нее характерны полностью полиэтиленовые или титановые фаланговые компоненты. Для улучшения интеграции в костномозговой канал производят плазменное напыление обеих ножек (рис. 3, а) [43].

В 1991 г. R.D. Koenig наблюдал 18 пациентов спустя 18 мес. после оперативного лечения, исследовал рентгенограммы для измерения межплюсневого угла, угла отведения большого пальца, длины первой плюсневой кости и определения положения импланта. Только в 7 случаях получено правильное положение эндопротеза и полная остеоинтеграция. В 12 случаях достигнут полный объем движения в 1 ПФС, а в одном случае при выявлении металлоза потребовалась ревизия. Впоследствии R.D. Koenig и L.R. Horwitz в 1996 г. опубликовали исследования 61 пациента за 5-летний послеоперационный период. У 80,5 % пациентов получены отличные результаты, и в 10 % случаев отмечены разной степени неудовлетворительные исходы [44].

В 1991 г. компания Orthopedic Bio-systems разработала имплант системы Bioaction Great Toe System. Данный эндопротез имеет плюсневый компонент, изготовленный из кобальт-хрома, и фаланговый компонент, изготовленный из титана и полиэтиленовой вставки. В настоящее время эта конструкция производится компанией Osteomed. R.S. Pulavarti et al. сообщили о 77 % удовлетворенных пациентов, в то время как у 23 % были выявлены рентгенологические признаки расшатывания и проседания импланта [45].

В 2019 г. на рынке появилась система Movement Great Toe System, произведенная в США (Integra, Нью-Джерси), — новый тотальный имплант (рис. 3, б). Компоненты анатомической формы имеют кобальт-хромовую суставную поверхность. Для улучшения остеоинтеграции по задней поверхности эндопроте-

за произведено титановое плазменное напыление. Конструкция ножки данного импланта отличается от других моделей, представленных на рынке. Цилиндрическая ножка с четырьмя ребрами обеспечивает улучшенную фиксацию и антиротационную стабильность. Для предотвращения повторного образования остеофитов плюсневый компонент имеет тыльный козырек. Компонент проксимальной фаланги содержит отверстия для швов на подошвенной части имплантата, что позволяет повторно прикрепить сгибательный аппарат в случае его повреждения. Эндопротез впервые имплантирован в январе 2018 г., и выпускается в четырех размерах [46].

М.Д. Johnson в 2016 г. проанализировал 35 пациентов с артрозом 1-го ПФС спустя 2 года после эндопротезирования, проведенного с использованием системы Movement Great Toe System. Он выяснил, что 82 % пациентов были удовлетворены результатами по шкале PASCОМ, а 62,9 % избавились от боли при ходьбе в обуви. Средний диапазон движений составил 57,6° при тыльном сгибании и 10,5° при подошвенном сгибании. Рентгенологических признаков расшатывания компонентов имплантата не было [47].

Керамические эндопротезы

В 1994 г. компания Moje Ceramic Implants (Petersperg, Германия) представила циркониевые керамические имплантаты для 1 ПФС. Плюсневый компонент имеет полусферическую форму, а фаланговый компонент — вогнутую. Их первоначальная конструкция включала два позиционирующих титановых винта для плюсневых и фаланговых компонентов, в то время как в современной конструкции используется метод press fit (рис. 3, в). Имплантат подвергают плазменному напылению с кристаллами апатита и фостерита для улучшения остеоинтеграции, он обладает очень хорошей биосовместимостью и превосходной устойчивостью к износу [48, 49].

Рис. 3. Внешний вид тотальных эндопротезов 1 ПФС: а — эндопротез системы Total Toe System, производство Biomet, Варшава, США, 1989 г.; б — эндопротез системы Movement Great Toe System, производство Integra, Нью-Джерси, США, 2019 г.; в — керамический эндопротез фирмы Moje Ceramic Implants, Петерсбург, Германия, 2004 г. [51]

В 2020 г. М.Т. Nagy et al. исследовали 30 пациентов после установки керамического тотального эндопротеза первого плюснефалангового сустава. Средний период наблюдения составил 81 ± 27 мес. после операции, средний диапазон пассивных движений сустава — 32° тыльного сгибания, средний балл по шкале AOFAS — 84 баллов. Довольны результатом 24 пациента (84 %). На последующих рентгенограммах выявлено изменение угла наклона эндопротеза, а также обнаружена миграция проксимального или дистального компонентов. В осложнения включен один случай раневой инфекции. Ревизия выполнена в 5 случаях (16 %) из-за расшатывания, миграции, подвывиха или разрушения ножки импланта. Приживаемость эндопротезов составила 92 % через 5 лет, 85 % — через 7 лет и 78 % — через 9 лет [50].

Гидрогелевые эндопротезы

Новый гидрогелевый имплант из поливинилового спирта (CARTIVA, Джорджия, США) получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в июле 2016 г. (рис. 4) и был апробирован в Великобритании и Канаде. Оба исследования показали многообещающие результаты до выхода на рынок США. Имплант, изготовленный из гидрогеля поливинилового спирта, при установке действует как прокладка между первой плюсневой костью и основанием проксимальной фаланги. Поскольку поливиниловый спирт нетоксичен и не канцерогенен, его используют при производстве контактных линз и упаковочных материалов для пищевых продуктов. По своей способности сопротивляться нагрузкам он при давлении в 17 МПа имеет предельную прочность на растяжение, сравнимую с хрящом человека, а также аналогичное содержание воды [52, 53].

Рис. 4. Гидрогелевый эндопротез 1 ПФС из поливинилового спирта (CARTIVA, Джорджия, США, 2016 г.) [54]

В проспективном исследовании, выполненном в 2018 г., J. Baumhauer et al. сравнили синтетический гидрогелевый имплант с артродезом по безопасности и эффективности (артродез первого плюснефалангового сустава применяют для лечения тяжелых степеней артроза). По завершении 24-мес. исследования в обеих группах пациентов, перенесших как эндопротезирование гидрогелевым имплантом Cartiva, так и артродезирование, отмечено значительное снижение интенсивности боли по шкале ВАШ. Частота повторных операций в группе после эндопротезирования имплантом из синтетического хряща составила 11 %, что эквивалентно частоте повторных операций в группе артродеза первого плюснефалангового сустава (12 %). Имплант из гидрогеля сохранил функцию и тыльное сгибание (в среднем 29,7°). Рентгенологические сравнения не выявили расшатывания или разрушения импланта, хотя у двух пациентов в проксимальной фаланге образовалась периостальная киста [55, 56].

W. Lee et al. в течение 26 мес. исследовали 90 пациентов, перенесших установку гидрогелевого импланта. Средний балл по шкале ВАШ составлял 4,0, по шкале AOFAS — 64 балла. На послеоперационных обзорных рентгенограммах, проведенных через 4 нед. после операции, миграцию имплантата наблюдали в 60 % случаев, а при последующих осмотрах — в 90 %. Резорбция кости, развившаяся вокруг импланта, выявлена при рентгенографии у 50 % пациентов [57, 58].

В целом, концепция гидрогелевых эндопротезов выглядит многообещающей. Для предотвращения миграции протезов этой разновидности, тем не менее, требуется провести значительную модернизацию их конструкции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование силиконовых эндопротезов обеспечило удовлетворительные функциональные результаты в 72 % случаев по шкале PASCOM. Наилучшего результата среди силиконовых имплантов достигло применение двустольного эндопротеза Swanson с титановыми втулками. Использование металлических гемизендопротезов в наилучшем варианте показало 74 % приживаемости импланта и 77 баллов по шкале AOFAS при применении импланта HemiCup DF. Результаты применения тотальных металлических эндопротезов показали 82 % удовлетворительных результатов по шкале PASCOM после установки эндопротеза системы Movement Great Toe System. После использования керамических тотальных имплантов фирмы Moje Ceramic пациенты были удовлетворены в 85 % случаев. Применение гидрогелевых эндопротезов показало до 50 % неудовлетворительных результатов. Эндопротезирование 1 ПФС претерпело значительные изменения за последние шесть десятилетий, а достижения в области технологий способствовали прогрессивным изменениям в материалах и хирургической технике. Импланты нового поколения имеют более прочную конструкцию, анатомичную форму, улучшенную остеоинтеграцию, их изготавливают из наиболее износостойких материалов. Эти достижения обеспечили повышение удовлетворенности пациентов и увеличение срока службы эндопротезов. Количество ревизионных операций после эндопротезирования 1 ПФС на сегодняшний день уменьшается и сопоставимо с числом повторных операций после артродезирования. Тем не менее, остается высокий процент осложнений после эндопротезирования 1 ПФС. Это свидетельствует о необходимости продолжения исследований и дальнейшей работы по усовершенствованию имплантов, чтобы сделать их более эффективными и удобными в использовании.

Конфликт интересов. Отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования. Работа включена в план исследовательской работы Самарского медицинского университета. Отсутствие внешнего финансирования при проведении исследования.

Этическая экспертиза не требуется.

Информированное согласие пациентов в случае данного исследования не применимо.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Карданов А.А. *Хирургическая коррекция деформация стопы*. М.: Медпрактика-М; 2016:220.
2. *Хирургия стопы и голеностопного сустава. Многосторонний подход*. Под ред. Хайера К.Ф., Берлета Г.Ч., Филбина Т.М. и др.; науч. ред. пер. О. А. Каплунов. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2022:528.
3. Márquez JA, Oliva XM. Hallux rigidus: aetiology, diagnosis, classification and treatment. *Rev esp cir ortop traumatol*. 2010;54(5):321-328. doi: 10.1016/S1988-8856(10)70254-6
4. Нурмухаметов М.Р. Принципы хирургического лечения больных с остеоартритом I плюснефалангового сустава. *Научно-практическая ревматология*. 2018;56(3):122-125. doi: 10.14412/1995-4484-2018-363-372
5. Hamid KS, Parekh SG. Clinical Presentation and Management of Hallux Rigidus. *Foot Ankle Clin*. 2015;20(3):391-9. doi: 10.1016/j.fcl.2015.04.002
6. Бобров Д.С., Слиянков Л.Ю., Ченский А.Д. и др. Деформирующий остеоартроз первого плюснефалангового сустава, или ригидный I палец стопы: клиника, диагностика и лечение (аналитический обзор литературы). *Кафедра травматологии и ортопедии*. 2014;(3):4-12.
7. Brage ME, Ball ST. Surgical options for salvage of end-stage hallux rigidus. *Foot Ankle Clin*. 2002;7(1):49-73. doi: 10.1016/S1083-7515(01)00004-3
8. Turner WA, Merriman LM. *Clinical Skills in Treating the Foot*. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone Publ.; 2005:496.

9. Sullivan MR. Hallux rigidus: MTP implant arthroplasty. *Foot Ankle Clin.* 2009;14(1):33-42. doi: 10.1016/j.fcl.2008.11.009
10. Joyce TJ. Implants for the first metatarsophalangeal joint and prospective considerations. *Expert Rev Med Devices.* 2005;2(4):453-464. doi: 10.1586/17434440.2.4.453
11. Stone OD, Ray R, Thomson CE, Gibson JN. Long-Term Follow-up of Arthrodesis vs Total Joint Arthroplasty for Hallux Rigidus. *Foot Ankle Int.* 2017;38(4):375-380. doi: 10.1177/1071100716682994
12. Linklater JM. Imaging of sports injuries in the foot. *AJR Am J Roentgenol.* 2012;199(3):500-508. doi: 10.2214/AJR.12.8547
13. Stokes IA, Hutton WC, Stott JR. Forces acting on the metatarsals during normal walking. *J Anat.* 1979;129(Pt 3):579-590.
14. Santos Silva M, Rodrigues-Pinto R, Barros LH, Sousa A, Muras J. Arthrodesis versus Arthroplasty of the First Metatarsophalangeal Joint in the Treatment of Hallux Rigidus - A Comparative Study of Appropriately Selected Patients. *Rev Bras Ortop (Sao Paulo).* 2020;55(1):40-47. doi: 10.1055/s-0039-1700815
15. Hallinan JTPD, Statum SM, Huang BK, et al. High-Resolution MRI of the First Metatarsophalangeal Joint: Gross Anatomy and Injury Characterization. *Radiographics.* 2020;40(4):1107-1124. doi: 10.1148/rg.2020190145
16. Vulcano E, Chang AL, Solomon D, Myerson M. Long-Term Follow-up of Capsular Interposition Arthroplasty for Hallux Rigidus. *Foot Ankle Int.* 2018;39(1):1-5. doi: 10.1177/1071100717732124
17. Perler AD, Nwosu V, Christie D, Higgins K. End-stage osteoarthritis of the great toe/hallux rigidus: a review of the alternatives to arthrodesis: implant versus osteotomies and arthroplasty techniques. *Clin Podiatr Med Surg.* 2013;30(3):351-395. doi: 10.1016/j.cpm.2013.04.011
18. Konkel KF, Menger AG, Retzlaff SA. Results of metallic Hemi-Great Toe Implant for Grade III and early Grade IV hallux rigidus. *Foot Ankle Int.* 2009;30(7):653-660. doi: 10.3113/FAI.2009.0653
19. Dos Santos AL, Duarte FA, Seito CA, et al. Hallux Rigidus: prospective study of joint replacement with hemiarthroplasty. *Acta Ortop Bras.* 2013;21(2):71-75. doi: 10.1590/S1413-78522013000200001
20. Vanore J, O'Keefe R, Pikscher I. Complications of silicone implants in foot surgery. *Clin Podiatry.* 1984;1(1):175-198.
21. Poutoglidou F, Drummond I, Ha J, et al. Thou Shalt Not Fuse: Implant Survival Outcomes And Complications Following Arthroplasty In Hallux Rigidus. *J Foot Ankle Surg (Asia-Pacific).* 2023;10(4):175-181. doi: 10.5005/jp-journals-10040-1316
22. Ris HB, Mettler M, Engeloch F. Langzeitergebnisse mit der Silastik-Endoprothese nach Swanson am Grosszehengrundgelenk. Diskrepanz zwischen Klinik und radiologischem Befund. *Zeitschr Orthop.* 1988;126:526-529. doi: 10.1055/s-2008-1044478
23. Kampner SL. Total joint replacement in bunion surgery. *Orthopedics.* 1978;1(4):275-84. doi: 10.3928/0147-7447-19780701-03
24. Kampner SL. Total joint prosthetic arthroplasty of the great toe--a 12-year experience. *Foot Ankle.* 1984;4(5):249-261. doi: 10.1177/107110078400400506
25. Swanson AB, Lumsden RM, Swanson GD. Silicone implant arthroplasty of the great toe. A review of single stem and flexible hinge implants. *Clin Orthop Relat Res.* 1979;(142):30-43.
26. Hetherington VJ, Cwikla PS, Malone M. Review of First Metatarsophalangeal Joint Implants. In: Hetherington VJ. (eds.) *Textbook of Hallux Valgus and Forefoot Surgery.* 2000:347-358.
27. Gerbert J. *Textbook of Bunion Surgery.* 4th ed. London; Eurospan Publ.; 2012:388.
28. Clough TM, Ring J. Silastic first metatarsophalangeal joint arthroplasty for the treatment of end-stage hallux rigidus. *Bone Joint J.* 2020;102-B(2):220-226. doi: 10.1302/0301-620X.102B2.BJJ-2019-0518.R2
29. Jarvis BD, Moats DB, Burns A, Gerbert J. Lawrence design first metatarsophalangeal joint prosthesis. *J Am Podiatr Med Assoc.* 1986;76(11):617-624. doi: 10.7547/87507315-76-11-617
30. Hetherington VJ, Cuesta AL. Implant arthroplasty of the first metatarsophalangeal joint and alternatives. In Levy LA, Hetherington VJ (eds.) *Principles and Practice of Podiatric Medicine.* New York: Churchill Livingstone Publ.; 1990:1005.
31. Dobbs B. LaPorta great toe implant. Long-term study of its efficacy. Student Research Group. *J Am Podiatr Med Assoc.* 1990;80(7):370-373. doi: 10.7547/87507315-80-7-370
32. Granberry W, Schafer KA, McCormick JJ, Marks RM. Forefoot Success. *Instr Course Lect.* 2021;70:587-610.
33. Joyce TJ. Implants for the first metatarsophalangeal joint and prospective considerations. *Expert Rev Med Devices.* 2005;2(4):453-464. doi: 10.1586/17434440.2.4.453
34. Brage ME, Ball ST. Surgical options for salvage of end-stage hallux rigidus. *Foot Ankle Clin.* 2002;7(1):49-73. doi: 10.1016/s1083-7515(01)00004-3
35. Hasselman CT, Shields N. Resurfacing of the First Metatarsal Head in the Treatment of Hallux Rigidus. *Tech Foot Ankle Surg.* 2008;7(1):31-40. doi: 10.1097/BTF.0b013e318165c356
36. ArthroSurface HemiCAP Resurfacing. In Wiesel SW. (ed.) *Operative Techniques in Orthopaedic Surgery.* 2nd ed. Philadelphia: LWW Publ.; 2015;4:135-146.
37. Butterworth ML, Ugrinich M. First Metatarsophalangeal Joint Implant Options. *Clin Podiatr Med Surg.* 2019;36(4):577-596. doi: 10.1016/j.cpm.2019.07.003
38. Jørsboe PH, Pedersen MS, Benyahia M, et al. Mid-Term Functionality and Survival of 116 HemiCAP® Implants for Hallux Rigidus. *J Foot Ankle Surg.* 2021;60(2):322-327. doi: 10.1053/j.jfas.2020.10.010
39. Park YH, Jung JH, Kang SH, et al. Implant Arthroplasty versus Arthrodesis for the Treatment of Advanced Hallux Rigidus: A Meta-analysis of Comparative Studies. *J Foot Ankle Surg.* 2019;58(1):137-143. doi: 10.1053/j.jfas.2018.08.045
40. Zeichner AM. Component first metatarsophalangeal joint replacement. A new approach. *J Am Podiatr Med Assoc.* 1985;75(5):254-257. doi: 10.7547/87507315-75-5-254
41. Merkle PF, Sculco TP. Prosthetic replacement of the first metatarsophalangeal joint. *Foot Ankle.* 1989;9(6):267-71. doi: 10.1177/107110078900900603
42. Boberg JS: Koenig total toe implant arthroplasty. In: Vickers NS, (ed.) *Reconstructive Surgery of the Foot and leg, Update 96.* Tucker, Ga: Podiatry Institute Publ.; 1996:136-138.
43. Koenig RD. Revision arthroplasty utilizing the Biomet Total Toe System for failed silicone elastomer implants. *J Foot Ankle Surg.* 1994;33(3):222-227.
44. Koenig RD, Horwitz LR. The Biomet Total Toe System utilizing the Koenig score: a five-year review. *J Foot Ankle Surg.* 1996;35(1):23-26. doi: 10.1016/s1067-2516(96)80008-1
45. Pulavarti RS, McVie JL, Tulloch CJ. First metatarsophalangeal joint replacement using the bio-action great toe implant: intermediate results. *Foot Ankle Int.* 2005;26(12):1033-1037. doi: 10.1177/107110070502601206
46. Barták V, Heřt J, Štědrý J, et al. Long-term results of total joint arthroplasty and phalangeal hemiarthroplasty of the first metatarsophalangeal joint using the ToeFit Plus™ system. *Foot Ankle Surg.* 2022;28(1):56-61. doi: 10.1016/j.fas.2021.01.014

47. Johnson MD, Brage ME. Total Toe Replacement in the United States: What Is Known and What Is on the Horizon. *Foot Ankle Clin.* 2016;21(2):249-266. doi: 10.1016/j.fcl.2016.01.004
48. Arbuthnot JE, Cheung G, Balain B, et al. Replacement arthroplasty of the first metatarsophalangeal joint using a ceramic-coated endoprosthesis for the treatment of hallux rigidus. *J Foot Ankle Surg.* 2008;47(6):500-504. doi: 10.1053/j.jfas.2008.08.007
49. Dawson-Bowling S, Adimonye A, Cohen A, et al. MOJE ceramic metatarsophalangeal arthroplasty: disappointing clinical results at two to eight years. *Foot Ankle Int.* 2012;33(7):560-564. doi: 10.3113/FAI.2012.0560
50. Nagy MT, Walker CR, Sirikonda SP. Second-Generation Ceramic First Metatarsophalangeal Joint Replacement for Hallux Rigidus. *Foot Ankle Int.* 2014;35(7):690-8. doi: 10.1177/1071100714536539
51. Johnson MD, Brage ME. Total Toe Replacement in the United States: What Is Known and What Is on the Horizon. *Foot Ankle Clin.* 2016;21(2):249-66. doi: 10.1016/j.fcl.2016.01.004
52. Richter M. Total joint replacement of the first metatarsophalangeal joint with Roto-Glide as alternative to arthrodesis. *Fuß Sprunggelenk.* 2019;17(1):42-50. doi: 10.1016/j.fuspru.2019.01.003
53. Daniels TR, Younger AS, Penner MJ, et al. Midterm Outcomes of Polyvinyl Alcohol Hydrogel Hemiarthroplasty of the First Metatarsophalangeal Joint in Advanced Hallux Rigidus. *Foot Ankle Int.* 2017;38(3):243-247. doi: 10.1177/1071100716679979
54. Glazebrook M, Morash J, Alhadhoud M, Daniels TR. Preliminary Experience With Polyvinyl Alcohol Hydrogel Implant for Pathology of the Second Metatarsal Head. *Foot Ankle Int.* 2019;40(11):1304-1308. doi: 10.1177/1071100719866700
55. Baumhauer JF, Singh D, Glazebrook M, et al. Prospective, Randomized, Multi-centered Clinical Trial Assessing Safety and Efficacy of a Synthetic Cartilage Implant Versus First Metatarsophalangeal Arthrodesis in Advanced Hallux Rigidus. *Foot Ankle Int.* 2016;37(5):457-469. doi: 10.1177/1071100716635560
56. Eble SK, Hansen OB, Chrea B, et al. Clinical Outcomes of the Polyvinyl Alcohol (PVA) Hydrogel Implant for Hallux Rigidus. *Foot Ankle Int.* 2020;41(9):1056-1064. doi: 10.1177/1071100720932526
57. Shimozono Y, Hurley ET, Kennedy JG. Early Failures of Polyvinyl Alcohol Hydrogel Implant for the Treatment of Hallux Rigidus. *Foot Ankle Int.* 2021;42(3):340-346. doi: 10.1177/1071100720962482
58. Lee W, Wang C, Prat D, et al. Patient Satisfaction Following Hallux Rigidus Treatment With a Synthetic Cartilage Implant. *Foot Ankle Spec.* 2023;16(6):527-536. doi: 10.1177/19386400211001993

Статья поступила 26.06.2023; одобрена после рецензирования 09.01.2024; принята к публикации 21.02.2024.

The article was submitted 26.06.2023; approved after reviewing 09.01.2024; accepted for publication 21.02.2024.

Сведения об авторах:

Геннадий Петрович Котельников — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой, info@samsmu.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7456-6160>;

Андрей Николаевич Николаенко — доктор медицинских наук, доцент кафедры, nikolaenko.83@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3411-4172>;

Иван Олегович Гранкин — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры, grankindoc@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3742-8935>;

Виктор Вячеславович Иванов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры, Viktor_travm@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2813-5826>;

Павел Юрьевич Исайкин — аспирант, pavelisaykin@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0460-6638>;

Святослав Олегович Дороганов — аспирант, svdor95@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7169-5370>;

Денис Олегович Згирский — аспирант, zgi-denis@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-2650-5190>.

Information about authors:

Gennady P. Kotelnikov — Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Head of the Department, info@samsmu.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7456-6160>;

Andrey N. Nikolaenko — Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, nikolaenko.83@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3411-4172>;

Ivan O. Grankin — Candidate of Medical Sciences, assistant of the department, grankindoc@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3742-8935>;

Viktor V. Ivanov — Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Viktor_travm@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2813-5826>;

Pavel Yu. Isaykin — graduate student, pavelisaykin@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0460-6638>;

Svyatoslav O. Doroganov — graduate student, svdor95@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7169-5370>;

Denis O. Zgirsky — graduate student, zgi-denis@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-2650-5190>.

Вклад авторов:

Котельников Г.П. — концептуализация.

Николаенко А.Н. — контроль, управление проектом.

Гранкин И.О. — концептуализация, валидация.

Иванов В.В. — участие в оценке опыта зарубежных коллег и в сборе данных по теме статьи.

Исайкин П.Ю. — исследование, написание (первоначальный вариант, редактирование, визуализация).

Дороганов С.О. — визуализация, написание – редактирование.

Згирский Д.О. — консультирование на основании практического опыта использования некоторых видов эндопротезов, анализ литературных данных.